
Cabinet des Docteurs V. BLIN – J.Y. COLLET - F. GOUAILLIER-VULCAIN et B. SEVRAY

Hôpital Privé Océane – 11 rue du Docteur Joseph AUDIC – BP 50020 – 56001 VANNES CEDEX

Consultations sur rendez-vous : 02 97 62 56 36 - Télécopie : 02 97 62 56 96 - www.vannes-vasculaire.fr

Standard de l'Hôpital Privé Océane : 02 97 62 56 56

LA CHIRURGIE DE VARICES

Une intervention chirurgicale sur vos varices est envisagée. La loi et la jurisprudence font obligation au corps médical de donner au patient une information claire et la plus complète possible sur cette intervention et sur les risques éventuels de complication qu'ils soient fréquents ou exceptionnels. Cette feuille que nous vous demandons de rapporter signée lors de votre intervention ne décharge pas votre chirurgien de sa responsabilité mais est simplement destinée à acter que vous avez été bien informé de l'existence possible de complications.

La médecine est un art, pas une science exacte et la chirurgie n'est rien d'autre qu'un artisanat hautement élaboré. Le bon sens indique que tout acte thérapeutique actif comporte une contrepartie et un risque de complications.

Toute anesthésie, toute intervention est un acte grave envisagé en tant que tel par les équipes qui les prennent en charge. Ces actes de chirurgie impliquent un contrat moral passé entre les équipes soignantes d'une part, le patient et sa famille d'autre part. Un acte chirurgical ne peut donc s'accomplir au mieux que dans un climat de confiance. Ces équipes sont habituées à prévenir les complications, font tout pour les éviter, mais sont aussi à même de les prendre en charge et de les assumer si malgré tout elles se manifestent autour de l'acte opératoire. Le traitement préventif de certaines complications (injection d'héparine sous-cutanée pour prévenir phlébite et embolie pulmonaire) peut entraîner en lui-même des complications (hématome, hémorragie, thrombose par phénomènes immuno-allergique).

Si nous ne pouvons vous informer de toutes les complications, y compris celles qui sont exceptionnelles, il est du moins possible de vous avertir de celles qui sont les plus fréquentes ou les plus graves. Il est également possible de vous donner à titre indicatif des taux de complication avec les réserves suivantes :

- Ce taux varie suivant les patients. Le risque opératoire est différent et augmente avec l'âge, avec des maladies comme l'hypertension artérielle, l'intoxication tabagique, le

diabète, les allergies, la baisse des défenses immunitaires, les antécédents cardio-vasculaires, les antécédents respiratoires comme la bronchite chronique et l'emphysème, etc...

- Ces taux n'ont qu'une valeur relative. Si pour une intervention une complication a une chance de survenue de 1%, cela signifie que pour 99 patients opérés sur 100 le taux de complication sera de 0, mais pour le centième patient, il sera de 100%.

Les complications liées à l'anesthésie (qu'elle soit générale, loco-régionale ou locale) vous seront expliquées par nos anesthésistes lors de la consultation. Des informations écrites vous seront remises et vous pourrez également poser des questions à l'anesthésiste que vous verrez lors de la consultation d'anesthésie avant votre intervention ainsi bien sûr qu'à votre médecin traitant.

Les complications de la chirurgie de varices qui vous est proposée sont expliquées par cette feuille que nous vous demandons de lire après la consultation. Si vous souhaitez d'autres renseignements plus précis ou plus spécifiquement adaptés à votre cas, nous vous conseillons de prendre rendez-vous une seconde fois en consultation avant la date d'intervention et nous pourrions en discuter ensemble de nouveau. Vous pourrez bien sûr également en parler à votre médecin traitant.

En matière de varices, comme dans tout autre type d'intervention, des complications peuvent toujours survenir. Certaines découlent directement de l'acte chirurgical, d'autres sont inhérentes à la chirurgie elle-même comme à toute intervention chirurgicale.

Les complications spécifiques :

1 – les complications artérielles sont extrêmement peu fréquentes. Du fait de la proximité anatomique, une plaie artérielle peut toujours survenir lors de la dissection. La

réparation de l'artère, surtout si l'artère est préalablement pathologique, peut elle-même être compliquée de phénomènes de thrombose. Ces accidents doivent être reconnus et peuvent engendrer une chirurgie artérielle d'urgence.

2 – des complications de type veineux sévère peuvent survenir après traumatisme veineux per-opératoire. Le stripping de la veine profonde est exceptionnel, par contre en l'absence même d'erreur d'identification du vaisseau, un traumatisme de la veine veineuse profonde est toujours possible. Le traitement de ces accidents relève bien évidemment de la chirurgie vasculaire restauratrice spécialisée, mais reste là aussi exceptionnelle.

3 – plus fréquentes sont les complications dites neurologiques. Certaines peuvent être graves, liées à un traumatisme ou à une compression des branches du nerf sciatique. D'autres sont moins exceptionnelles, il s'agit de troubles sensitifs secondaires à la contusion des nerfs accompagnant les veines saphènes internes ou saphènes externes lors du traitement chirurgical. Dans la plupart des cas ces traumatismes sont responsables d'une zone d'hypoesthésie de surface variable. Cette zone peut disparaître entièrement ou diminuer au fil des mois, par contre la survenue d'une névralgie peut se rencontrer, beaucoup plus ennuyeuse car nécessitant la prescription de médicaments ou de traitements qui prolongent la convalescence au-delà des délais habituels.

4 – des complications lymphatiques peuvent être observées. Elles se manifestent par la constitution possible d'une collection au niveau de l'aîne le plus souvent.

Ces tuméfactions ne sont généralement pas douloureuses mais peuvent se surinfecter et nécessiter secondairement un geste chirurgical spécifique de drainage, de nettoyage ou de coagulation. Plus rarement ce problème lymphatique peut se traduire par un œdème, un gonflement important de la jambe qui va nécessiter une contention élastique au-delà des délais habituels. Ces complications surviennent plus fréquemment lorsque le patient a déjà été opéré de varices antérieurement.

Les complications spécifiques :

Sont les complications liées à toute chirurgie :

- **La survenue d'une phlébite et d'une éventuelle embolie pulmonaire est rare**, tout un ensemble de précautions entourent et suivent l'intervention pour éviter ce type de complication.
- **Les hématomes sont la règle**, sont parfois impressionnants, mais généralement se résorbent. Il est exceptionnel que l'on soit amené à réintervenir pour un hématome non infecté.

- **Des infections au niveau des cicatrices** peuvent survenir, leur fréquence est inférieure à 2%.
- **Des retards de cicatrisation en dehors de l'infection sont exceptionnels.** Ils peuvent quelques fois malgré tout survenir lorsque la peau a été très abîmée antérieurement par les varices.
- Ensuite, suite à l'intervention de varices, il arrive que se développent des petites varicosités sur les trajets des veines enlevées.

Les résultats :

Enfin, en dehors même de toute complication, certaines interventions peuvent avoir un résultat aléatoire. Ce résultat ne peut jamais être garanti à l'avance. Une part de risque de résultat incomplet est toujours possible : persistance d'un inconfort au niveau des jambes lié à une part d'insuffisance lymphatique associée... Si vous exigez un résultat parfait, si vous doutez, il est préférable de ne pas vous faire opérer. Prenez alors un autre avis.

Lisez et relisez cette lettre avec votre famille et avec votre médecin traitant. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute information complémentaire.

Nous vous demandons avant l'intervention de joindre à votre dossier médical cette feuille, datée et signée de votre main, dans le seul but d'attester que vous avez bien reçu avant votre intervention, une information la plus complète et la plus honnête possible.

Date :

NOM :

Prénom :

Signature :